

2019年産はだか麦・小麦の栽培しおりの 中期除草剤に関する重要なお知らせ

2019年産はだか麦・小麦の栽培しおりに掲載されています「アクチノール乳剤」が農薬メーカーの事情により、在庫量の確保ができない状況となっております。また、「アクチノール乳剤」の生産再開は早くても12月の見込みとなっております。

このため、2019年産はだか麦・小麦においては、「**アクチノール乳剤**」の代替剤として「**エコパートフロアブル(ピラフルフェンエチル:2.0%)**」を使用してください。

エコパートフロアブル使用基準

麦種	対象雑草名	使用時期/回数	10aあたり 使用量
小麦 (さめきの夢 2009)	畑地一年生 広葉雑草	麦節間伸長開始期まで (一年生広葉雑草2~4葉期) (ただし、収穫45日前まで) /2回以内	50~100ml
はだか麦 (イチバンボシ)			

使用上の主な注意点・特性

1. 本除草剤の有効成分であるピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数は2回以内とする。
2. 展着剤は薬害を助長するおそれがあるので使用しない。
3. 麦踏み後数日間は使用を避ける。
4. 付近の作物にかからないようにする。
5. 散布直後に降雨が予想される場合は使用を避ける。
6. 白色斑点を生じる場合があるが、その後の生育に影響しない。
7. イネ科雑草には効果がない。
8. ヤエムグラに対する効果は高い。
(ヤエムグラは2~6節期までに散布する。)

農薬を使用する際は、薬剤のラベルをよく読んで使用してください！